

Kære kollega.

I forbindelse med overgang til nyt IT-laboratoriesystem på KPLL den 26.01.10 blev der foretaget ændringer i visse reference-intervaller, indført nogle nye analysemetoder og indført nye såkaldte NPU-koder.

Noget af dette er beskrevet i KPLL-Nyt 2010-1 (Særnummer).

Vi er blevet gjort bekendt med en uheldig konsekvens for visse analysesvar i nogle lægesystemer.

De berørte analyser er anført i vedlagte bilag.

**Konsekvensen var, at referenceintervaller og evt. markering for svar udenfor referenceintervaller ikke blev vist i de berørte lægesystemer for de berørte analyser.**

Alarmsvar er dog blevet ringet ud på vanlig vis.

KPLL mener nu at have løst problemet og vi håber det ikke har medført for store problemer for Jer.

Med venlig hilsen

Niels Mosbæk  
Adm.chef., spec.læge alm.med.

Analyser der kan have manglet referenceinterval og markering.

Adrenalin;dU  
Albumin/Crea;U  
Albumin;dU  
Albumin;U  
Amylase;P  
Amylase;U  
ANA ekskl.DNA Ab  
Bilirubin konj;P  
BNP;P  
Carbamid;P  
CEA;P  
Cobalamin;P  
CRP;P  
Delta-Aminole.;dU  
Diazepam;P  
DNA Ab;P  
EBV-IgG(0-1-2);P  
Estradiol;P  
Etanol;P  
Folater;P  
Gluc.tol.120;P  
Gluc.øgn.(max);P(kB)  
HCG;P  
Hep A IgM;P  
Hep Bs Ab;P  
Histaminkontrol  
Hæm med diff.  
Hæmoglo.frit;P  
IgE;P  
Immunkompleks.;P  
KF 2+7+10;P  
LH;P  
Lipoprotein(a);P  
Progesteron;P  
PSA;P  
Renin;P  
Rheumafaktor;P  
Rubella IgG;P  
Salicylat;P  
Sperm.ubevæg;Sem  
Sperma-Ab;P  
TPO-Ab;P  
Transglut.IgA;P  
Transglut.IgG;P  
Troponin I;P  
Tryptase;P  
Urinstix