

## Vejledning i opsamling af døgnurin til 5-Hydroxyindolyacetat

### 1. På laboratoriet udleveres:

Vejledning

2,5 liter plastdunk med syre

Tragt

5 opsamlingsbægre á 0,5 liter


Ved behov, udleveres en ekstra dunk.

Dunken indeholder en lille mængde væske, denne må **ikke** hældes ud!

Dunken skal mærkes med navn og CPR-nr., startdato og starttidspunkt.

### 2. Patientforberedelse

De bør i **1 døgn før og under selve døgnurinopsamling** undgå at indtage:



- Ananas
- Avokado
- Banan
- Skimmelost
- Kiwifrugt
- Blommer
- Chokolade
- Tomater
- Valnødder
- Grøntsager
- Vin og spiritus


Visse lægemidler kan påvirke resultatet. De bør tale med Deres læge om dette, hvis De

indtager nogle af følgende lægemidler: Hostemedicin, acetylsalicylsyre, atenolol, fluorouracil, imipramin, isoniazid, methenamin, methyldopa, monoaminoxidase-B-hæmmere, naproxen, paracetamol, tetracosactid, tiazider.

**Lægen bør tage stilling** til, om lægemidlet kan seponeres 3 døgn før og under selve døgnurinopsamlingen.


### 3. Opsamling

Opsamlingen af døgnurin foregår mest praktisk fra én morgen til næste morgen (24 timer).



Lad vandet i toilettet og notér tidspunktet **efter** urintømningen (fx kl. 7.00).

**Herefter** skal al den urin opsamles, som lades i det følgende døgn, indtil



samme klokkeslæt næste morgen, hvor urinen opsamles for sidste gang.

Under opsamlingen skal urindunk opbevares i køleskab.

### 4. Aflevering

Samme dag som urinopsamlingen slutter, skal dunken med urin samt henvisning eller rødt kort afleveres på et af laboratorierne i følgende periode:

**KPLL, Pilestræde 65:**

**Mandag til fredag kl. 7.00 – 14.00.**

**Torsdag tillige kl. 07.00 – 17.30.**

**KPLL filialer:**

**Man-, tirs-, ons- og fredag kl. 7.00 – 11.30.**

**Gladsaxe og Glostrup dog kl. 7.00 – 13.00.**

**Torsdag kun kl. 15.00 – 17.30.**